

のびのび消毒手順

1 教材教具（毎日）

消毒用アルコールを噴霧のちふき取り→乾燥の為広げる

2 室内

（単位ごと）

各ドアノブ ジャグち テーブル 椅子 トイレ洗浄レバー 等（子ども来所者が触る場所）

消毒用アルコール（セーフコール原液）噴霧のちふき取り乾燥（火気に注意）

トイレ 次亜塩素酸ナトリウム0.1%希釈液噴霧のち拭き上げ

3 子ども用コップ・皿（使用毎）

次亜塩素酸ナトリウム0.1%溶液を毎朝作成（24時間有効翌朝廃棄）

コップ使用後洗浄して60分以上つける

4 室内空間

空間除菌剤使用（クレベリン）（常時）

次亜塩素酸ナトリウム0.1%溶液を室内空間に噴霧（壁床など含む）（毎日）

【次亜塩素酸ナトリウム注意点】

次亜塩素酸ナトリウム→塩素系漂白剤

（次亜塩素酸ナトリウム）商品名 ミルトン つけるだけ など

濃度（希釈率）は適正に行う。（間違っても濃くしない）

OA 機器には噴霧しない

（OA キーボード・コピータッチパネルなどはアルコールを含めたガーゼ等を使用）

手指の消毒には使用しない

ディスポ手袋を使用すること

【手指消毒液の作り方】

セーフコール8：蒸留水2で混合

手指消毒液注意点

主成分 アルコール

火気厳禁ですセーフコール原液は燃えます。

アルコールなので手が荒れる。適時保湿用クリームなどを使用する。

手が赤くはれるなどの症状が出た場合はアレルギーの可能性もあるので使用しない。